



绝密 ★ 考试结束前

# 全国 2021 年 10 月高等教育自学考试 内科护理学(一)试题

课程代码:02998

1. 请考生按规定用笔将所有试题的答案涂、写在答题纸上。
2. 答题前,考生务必将自己的考试课程名称、姓名、准考证号用黑色字迹的签字笔或钢笔填写在答题纸规定的位置上。

选择题部分

注意事项:

每小题选出答案后,用 2B 铅笔把答题纸上对应题目的答案标号涂黑。如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案标号。不能答在试题卷上。

**一、单项选择题:**本大题共 30 小题,每小题 1 分,共 30 分。在每小题列出的备选项中只有一项是最符合题目要求的,请将其选出。

1. 急性支气管炎最主要的病因是
  - 感染
  - 过敏反应
  - 吸烟
  - 大气污染
2. 大量咯血是指 24 小时咯血量超过
  - 100ml
  - 200ml
  - 500ml
  - 800ml
3. 肺心病患者死亡的首要原因是
  - 休克
  - 心律失常
  - 酸碱失衡
  - 肺性脑病
4. 支气管哮喘的典型体征是
  - 呼气相延长伴广泛哮鸣音
  - 吸气相延长伴广泛哮鸣音
  - 肺部散在湿啰音
  - 胸膜摩擦音
5. I 型呼吸衰竭的血气分析特点是
  - $\text{PaO}_2 < 60 \text{ mmHg}$ ,  $\text{PaCO}_2$  降低或正常
  - $\text{PaO}_2 < 60 \text{ mmHg}$ ,  $\text{PaCO}_2 > 50 \text{ mmHg}$
  - $\text{PaO}_2 < 50 \text{ mmHg}$ ,  $\text{PaCO}_2 > 60 \text{ mmHg}$
  - $\text{PaO}_2 < 50 \text{ mmHg}$ ,  $\text{PaCO}_2$  降低或正常



6. 患者血压突然明显升高，伴有严重头痛、呕吐、抽搐、昏迷，提示患者出现了
- A. 高血压危象      B. 继发性高血压  
C. 恶性高血压      D. 高血压脑病
7. 经股动脉行冠状动脉造影术后患者应平卧
- A. 8h      B. 12h  
C. 24h      D. 48h
8. 心力衰竭最常见、最重要的诱发因素是
- A. 输液过多过快      B. 心房颤动  
C. 呼吸道感染      D. 中重度贫血
9. 患者，男性，45岁，慢性心力衰竭病史5年。近2天感觉体力下降伴双下肢水肿，爬2层楼出现呼吸困难。根据NYHA心功能不全分级标准，该患者心功能为
- A. I级      B. II级  
C. III级      D. IV级
10. 消化性溃疡治疗的药物中，能抑制 $H^+-K^+$ -ATP酶，使其不可逆失活，从而有效减少胃酸分泌的是
- A. 法莫替丁      B. 铝碳酸镁  
C. 奥美拉唑      D. 米索前列醇
11. 肝性脑病最常见的病因是
- A. 原发性肝癌      B. 肝硬化  
C. 重症病毒性肝炎      D. 严重胆道感染
12. 溃疡性结肠炎患者都会有的症状是
- A. 腹泻      B. 腹痛  
C. 腹胀      D. 食欲不振
13. 血供占全身灌流量最多的器官是
- A. 肝脏      B. 肾脏  
C. 肺脏      D. 脾脏
14. 患者，男性，35岁，慢性肾小球肾炎病史10余年。近期出现食欲不振，疲乏无力，夜尿增多。实验室检查：血Cr $510\mu\text{mol}/\text{L}$ ，血BUN $23\text{mmol}/\text{L}$ ，肌酐清除率 $15\text{ml}/\text{min}$ 。该患者每日蛋白质摄入量应为
- A.  $0.3\text{g}/\text{kg}$       B.  $0.6\text{g}/\text{kg}$   
C.  $1.0\text{g}/\text{kg}$       D.  $1.4\text{g}/\text{kg}$



15. 再生障碍性贫血的常见临床表现，不正确的是
- A. 进行性贫血
  - B. 出血
  - C. 反复感染
  - D. 肝脾淋巴结肿大
16. 特发性血小板减少性紫癜患者应避免使用
- A. 泼尼松
  - B. 环磷酰胺
  - C. 阿莫西林
  - D. 阿司匹林
17. 可引起出血性膀胱炎的化疗药物是
- A. 长春新碱
  - B. 阿糖胞苷
  - C. 柔红霉素
  - D. 环磷酰胺
18. 终止弥散性血管内凝血病理过程、重建凝血-抗凝平衡的重要措施是
- A. 治疗原发病，去除诱因
  - B. 补充凝血因子和血小板
  - C. 抗凝治疗
  - D. 溶栓疗法
19. 淡漠型甲亢主要见于
- A. 老年人
  - B. 育龄期妇女
  - C. 青少年
  - D. 婴幼儿
20. 下列属于糖皮质激素生理功能的是
- A. 调节钙磷代谢
  - B. 抗炎抗过敏
  - C. 兴奋心脏，升高血压
  - D. 促进蛋白质合成
21. 患者，男性，16岁，诊断1型糖尿病3年，采用胰岛素泵治疗。为了判断其近3个月血糖控制状况，首选的检查是
- A. 尿糖测定
  - B. 糖化血浆白蛋白测定
  - C. 糖化血红蛋白测定
  - D. 葡萄糖耐量试验
22. 不符合类风湿关节炎临床表现的是
- A. 大多数患者有晨僵
  - B. 关节痛往往是最早的关节症状
  - C. 心力衰竭是最常见的心脏受累表现
  - D. 部分患者可出现干燥综合征
23. 患者，女性，22岁，因面部出现蝶形红斑，血中找到狼疮细胞，确诊“系统性红斑狼疮”入院。该患者护理要点正确的是
- A. 卧床休息，半坐卧位
  - B. 饮食以高热量、低蛋白、富含维生素、易消化为原则
  - C. 选用同一种化妆品，清洁皮肤宜用中性肥皂
  - D. 注意口腔及会阴部皮肤清洁，剪指甲勿过短



24. 热射病患者应迅速采取降温措施，要求 1 小时内直肠温度降至  
A. 38.9~39.8℃      B. 37.8~38.9℃  
C. 36.9~37.8℃      D. 35.8~36.9℃
25. 果农给果树喷洒敌百虫后出现头痛、恶心、大汗、轻度呼吸困难，来急诊就诊。下列治疗措施中正确的是  
A. 用热水和酒精擦洗污染的皮肤      B. 用 2% 碳酸氢钠洗胃  
C. 尽早开始阿托品治疗      D. 监测血液碳氧血红蛋白浓度
26. 确定传染病检疫期及密切接触者医学观察期的重要依据是  
A. 传染期      B. 潜伏期  
C. 前驱期      D. 隔离期
27. 引起甲型肝炎爆发流行的主要传播途径是  
A. 血液      B. 日常生活接触  
C. 水和食物      D. 性接触
28. 切断流行性乙型脑炎传播途径，预防疾病发生的主要措施是  
A. 加强水源管理      B. 严格粪便管理  
C. 加强血源管理      D. 防蚊灭蚊
29. 艾滋病患者机会性感染最常见的病原体是  
A. 卡氏肺孢子虫      B. 隐孢子虫  
C. 弓形虫      D. 隐球菌
30. 预防狂犬病最有效的措施是  
A. 加强犬的管理      B. 及时有效地处理伤口  
C. 接种狂犬病疫苗      D. 接种人抗狂犬病球蛋白



## 非选择题部分

### 注意事项：

用黑色字迹的签字笔或钢笔将答案写在答题纸上，不能答在试题卷上。

### 二、填空题：本大题共 15 空，每空 1 分，共 15 分。

31. 肺换气是通过\_\_\_\_\_以弥散的方式进行的。
32. 每年咳嗽、咳痰至少\_\_\_\_\_个月，并连续 2 年或更长时间，能除外其他原因引起的慢性咳嗽，临床可诊断为慢性支气管炎。
33. 肺癌中恶性度最高的类型是\_\_\_\_\_。
34. 循环系统疾病出现呼吸困难主要见于左心功能不全，其产生的主要原因是肺\_\_\_\_\_、肺组织弹性下降。
35. 血液中还原血红蛋白增多所致皮肤黏膜呈现青紫色的现象，称为\_\_\_\_\_。
36. 胃溃疡的疼痛节律是\_\_\_\_\_。
37. 肝硬化最突出的临床表现是\_\_\_\_\_。
38. 慢性粒细胞白血病的根治性标准治疗方法是\_\_\_\_\_。
39. 血清\_\_\_\_\_测定是诊断 Graves 病的重要指标。
40. 2 型糖尿病与遗传因素和环境因素的关系密切，其发病机制与胰岛素抵抗和\_\_\_\_\_有关。

41. 狼疮性肾炎患者最常见的死亡原因是\_\_\_\_\_。

42. 有机磷杀虫药可经\_\_\_\_\_、胃肠道、皮肤黏膜迅速吸收。

43. 吗啡中毒可表现为瞳孔\_\_\_\_\_。

44. 人类免疫缺陷病毒（HIV）存在于感染者的血液及各种\_\_\_\_\_中。

45. 对某种传染病缺乏\_\_\_\_\_免疫力的人称为易感者。

### 三、名词解释题：本大题共 5 小题，每小题 3 分，共 15 分。

46. 支气管扩张症

47. 晕厥

48. 黄疸

49. 系统性红斑狼疮

50. 母婴传播

### 四、简答题：本大题共 4 小题，每小题 5 分，共 20 分。

51. 简述胸部叩击的注意事项。

52. 简述急性胰腺炎患者病情观察的内容。

53. 简述急性白血病患者化疗的护理要点。

54. 简述甲状腺危象的临床表现。



五、论述题：本大题共 2 小题，每小题 10 分，共 20 分。

55. 患者，男性，52 岁，主因“间断胸痛 2 年，加重伴大汗、恶心 3 小时”以“急性心肌梗死”收入院。查体：T 38.2°C，P 52 次/分，R 20 次/分，BP 150/90mmHg，患者精神差，听诊心尖部第一心音减弱，心电图见 II、III、AVF 导联 ST 段弓背样抬高，心肌损伤标记物检查示肌钙蛋白 T 增高。医嘱予心电监护、吸氧、止痛、溶栓治疗。

请写出：（1）与心绞痛相比，心肌梗死胸痛的特点；

- （2）该患者可能出现的并发症；
- （3）该患者溶栓治疗的护理要点。

56. 患者，男性，35 岁，因重症胰腺炎入院。近 3 天患者尿量进行性减少，24 小时尿量 200ml。查体：T 38.6°C，P 96 次/分，R 20 次/分，BP 140/75mmHg，眼睑及口唇苍白，双下肢可凹性中度水肿。实验室检查：尿蛋白++，Hb 90g/L，血 Cr 760μmol/L，血 BUN 28mmol/L，K<sup>+</sup> 6.5mmol/L，临床考虑“急性肾功能衰竭”，拟行血液透析治疗。

请写出：（1）该患者透析治疗的目的；

- （2）该患者目前病情观察的要点；
- （3）该患者高钾血症的紧急处理措施。

**自考大网校**  
www.zikaoda.com