



绝密 ★ 考试结束前

全国 2021 年 10 月高等教育自学考试

妇产科学(一) 试题

课程代码:03002

1. 请考生按规定用笔将所有试题的答案涂、写在答题纸上。

2. 答题前,考生务必将自己的考试课程名称、姓名、准考证号用黑色字迹的签字笔或钢笔填写在答题纸规定的位置上。

选择题部分

注意事项:

每小题选出答案后,用 2B 铅笔把答题纸上对应题目的答案标号涂黑。如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案标号。不能答在试题卷上。

一、单项选择题:本大题共 25 小题,每小题 1 分,共 25 分。在每小题列出的备选项中只有一项是最符合题目要求的,请将其选出。

1. 在女性外生殖器中,位于阴道前庭内的组织是
A. 阴阜
B. 大阴唇
C. 阴道口
D. 小阴唇
2. 从胎儿前囟中央至枕骨隆突下方的距离称为
A. 双顶径
B. 枕额径
C. 枕颈径
D. 枕下前囟径
3. 在放置产钳时,当胎头骨质部分已达坐骨棘下 3cm,矢状缝位于骨盆出口前后径上,胎头已拨露时可使用
A. 低位产钳
B. 中位产钳
C. 高位产钳
D. 后出头产钳
4. 骨盆出口狭窄时,若考虑阴道试产,可进一步测量骨盆的
A. 对角径
B. 后矢状径
C. 坐骨棘间径
D. 坐骨结节间径
5. 妇科肿瘤患者静脉用药化疗后,受药量最大的器官是
A. 心脏
B. 肺脏
C. 肝脏
D. 肾脏



6. 关于中期妊娠引产，下列描述正确的是
- A. 利凡诺引产后 48 小时无宫缩即为引产失败
- B. 引产后每日冲洗外阴 4 次以防止感染
- C. 引产后给予雌激素口服以防止泌乳
- D. 引产后 1 个月内禁止性生活及盆浴
7. 下列不属于围绝经期综合征妇女临床表现的是
- A. 尿道粘膜萎缩
- B. 月经周期无改变
- C. 阴道干燥不适
- D. 阵发性面部潮热
8. 产褥期子宫颈完全恢复至正常状态的时间是产后
- A. 1 周
- B. 2 周
- C. 3 周
- D. 4 周
9. 某女，37 岁，平素月经规律，单胎妊娠，宫底位于脐下一横指，该孕妇妊娠周数可能是
- A. 16 周末
- B. 20 周末
- C. 24 周末
- D. 28 周末
10. 正常新生儿脐带脱落一般在出生后
- A. 1~3 天
- B. 3~5 天
- C. 5~7 天
- D. 7~14 天
11. 妇科肿瘤化疗药物的主要毒副反应中，同时具有肾毒性及神经毒性的是
- A. 顺铂
- B. 环磷酰胺
- C. 甲氨蝶呤
- D. 长春新碱
12. 关于产褥感染，下列描述正确的是
- A. 感染症状一般出现在产后 3~7 天
- B. 患者应取平卧位以利于恶露的排出
- C. 患者每日补充液体不应低于 1000ml
- D. 病毒是引起产褥感染的最常见病原体
13. 关于妇科术后患者出院教育，下列描述正确的是
- A. 全子宫切除术后 1 个月有阴道血性分泌物属正常现象
- B. 子宫脱垂患者术后 1 个月内应避免重体力劳动
- C. 首次随访时间为出院后 1 周
- D. 伤口拆线后 1 周可淋浴
14. 妊娠合并病毒性肝炎最常见的类型是
- A. 甲型
- B. 乙型
- C. 丙型
- D. 戊型
15. 下列不孕症病因中，属于子宫因素的是
- A. 附件囊肿
- B. 排卵障碍
- C. 阴道畸形
- D. 宫腔肿瘤



16. 关于胎盘早剥, 下列描述正确的是
- A. 重型胎盘早剥子宫硬如板状, 有压痛
 - B. 以无诱因无痛性反复阴道流血为特点
 - C. 贫血严重程度与阴道流血量呈正比
 - D. 一旦确诊即可选择期待疗法
17. 正常成年女性骨盆倾斜度一般为
- A. 75 度
 - B. 60 度
 - C. 45 度
 - D. 30 度
18. 妊娠期循环血容量逐渐增加, 达到高峰时期是在妊娠
- A. 28~30 周
 - B. 30~32 周
 - C. 32~34 周
 - D. 34~36 周
19. 引起急性胎儿窘迫的常见原因不包括
- A. 宫缩过频过强
 - B. 胎盘早剥
 - C. 胎盘功能不全
 - D. 脐带过短
20. 由于胎盘因素导致的产后出血, 下列处理正确的是
- A. 胎盘已剥离但未排出, 应立即手取胎盘
 - B. 胎盘部分剥离致出血, 应立即切除子宫
 - C. 胎盘嵌顿出血, 在乙醚全麻下手取胎盘
 - D. 胎盘植入引起的出血, 应立即挤压宫底
21. 下列用于治疗滴虫性阴道炎的药物是
- A. 甲硝唑
 - B. 青霉素
 - C. 克霉唑
 - D. 链霉素
22. 慢性宫颈炎治疗前, 为排除早期宫颈癌, 应首先进行的检查是
- A. 宫颈刮片
 - B. 宫腔镜
 - C. 白带检查
 - D. B 型超声
23. 子宫颈癌的临床表现, 最早表现为
- A. 阴道排液
 - B. 接触性出血
 - C. 下肢肿胀
 - D. 坐骨神经痛
24. 子宫肌瘤在妊娠期非常容易发生
- A. 红色变性
 - B. 囊性变
 - C. 玻璃样变
 - D. 肉瘤变
25. 下列不属于葡萄胎临床表现的是
- A. 妊娠剧吐
 - B. 停经及阴道出血
 - C. 子宫增长迅速
 - D. 阴道紫蓝色结节



非选择题部分

注意事项:

用黑色字迹的签字笔或钢笔将答案写在答题纸上,不能答在试题卷上。

二、填空题:本大题共 15 空,每空 1 分,共 15 分。

26. 短效口服避孕药应自月经的第_____天开始服用,每晚一片,连服 22 天,不能间断。
27. 妇科手术切口分为三类,其中 II 类为可能_____切口。
28. 妊娠期胎盘分泌的激素,在不同程度上都有对抗_____的作用,因此糖尿病孕妇应密切监测血糖变化。
29. 母体纵轴与胎体纵轴的关系称为_____。
30. 产后恶露分为三个阶段,分别是血性恶露、_____恶露和白色恶露。
31. 行胎头吸引器助产术时,胎头吸引器抽吸负压后应稍等待,必须使胎头在缓慢负压下形成_____再牵引。
32. 胎盘早剥根据病理生理不同表现分为外出血、内出血和_____出血。
33. 早开奶的目的是通过婴儿吸吮,刺激母亲垂体释放_____及催产素。
34. 枕左前位分娩时,胎头娩出后,枕部向左旋转 45 度,使胎头与胎肩成正常关系,称为_____。
35. 新生儿呼吸主要依靠膈肌运动,以_____呼吸为主。
36. 在下丘脑-垂体-卵巢轴的调节过程中,当卵巢分泌的激素增多时,可使下丘脑分泌受到抑制,此为_____反馈。
37. 妇科肿瘤患者化疗时,联合用药要遵守的原则:第一,几种药物的_____不同;第二,药物的副作用不能叠加;第三,单药应用对肿瘤有效。
38. 妇科肿瘤患者化疗时,血小板低于_____/L 即有自发性出血的可能。
39. 用于子宫内膜癌治疗的激素类药物主要是_____类药物。
40. 健康女性子宫颈管的粘液呈_____性,可使病原体的繁殖受到抑制。

三、名词解释题:本大题共 5 小题,每小题 3 分,共 15 分。

41. 功能失调性子宫出血
42. 月经周期
43. 晚期减速
44. 突破性出血
45. 宫颈活体组织检查



四、简答题：本大题共 5 小题，每小题 5 分，共 25 分。

46. 简述妊娠合并糖尿病妇女的临床表现。
47. 简述妇科手术术后预防肺部感染的护理措施。
48. 简述母乳喂养过程中母亲的体位和婴儿含接姿势。
49. 简述子宫内膜异位症的护理措施。
50. 简述卵巢肿瘤并发症的护理。

五、论述题：本大题共 2 小题，每小题 10 分，共 20 分。

51. 某女，31 岁，孕 28 周，单胎妊娠。常规行产前检查：宫高 26cm，腹围 88cm，头先露，胎心好，双下肢无浮肿。

根据以上资料，请回答：

- (1) 宫高、腹围的测量方法；
- (2) 该类孕妇产前复诊的内容。

52. 某女，26 岁，主诉不规则阴道流血，伴咳嗽、痰中带血 1 个月。既往月经规律，1 年前曾因葡萄胎清宫。妇科检查：子宫如孕 4 个月大小，质软、表面光滑。辅助检查结果：血 HCG 异常增高，胸片可见右下肺团状阴影，肺纹理增粗。

根据以上资料，请回答：

- (1) 该患者可能的医疗诊断；
- (2) 该类患者的处理原则；
- (3) 该类患者当前转移部位的护理措施。