

2022 年 10 月高等教育自学考试  
**儿科护理学(二) 试题**  
课程代码:03011

1. 请考生按规定用笔将所有试题的答案涂、写在答题纸上。
  2. 答题前，考生务必将自己的考试课程名称、姓名、准考证号用黑色字迹的签字笔或钢笔填写在答题纸规定的位置上。

## 选择题部分

#### 注意事项：

每小题选出答案后,用2B铅笔把答题纸上对应题目的答案标号涂黑。如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案标号。不能答在试题卷上。

**一、单项选择题：**本大题共 30 小题，每小题 1 分，共 30 分。在每小题列出的备选项中只有一项是最符合题目要求的，请将其选出。

1. 正常婴儿，体重 7.2kg，可独坐片刻，能辨认陌生人和熟人，最可能的月龄是  
A. 2 个月 B. 4 个月  
C. 6 个月 D. 8 个月
  2. 幼儿住院出现分离性焦虑可表现出  
A. 退化行为 B. 多动障碍  
C. 破坏行为 D. 强迫行为
  3. 左向右分流型先天性心脏病患儿生长发育落后是由于  
A. 肺循环血量减少 B. 体循环血量减少  
C. 肺循环血量增加 D. 体循环血量增加
  4. 患儿男，8 个月，诊断为法洛四联症，今日哭闹后出现呼吸困难，青紫加重，应立即给患儿采取的正确体位是  
A. 头高足低位 B. 膝胸位  
C. 俯卧位 D. 平卧位
  5. 按计划免疫程序，小儿接种乙脑减毒活疫苗的适宜月龄是  
A. 3 个月 B. 6 个月  
C. 8 个月 D. 12 个月

6. 早产儿用氧浓度过高、时间过长可导致  
A. 脑出血 B. 支气管肺发育不良  
C. 肺透明膜病 D. 缺氧缺血性脑病

7. 新生儿窒息可能出现的并发症是  
A. 甲状腺功能减退 B. 新生儿溶血症  
C. 缺氧缺血性脑病 D. 黄疸

8. 诊断新生儿轻度窒息的 Apgar 评分为  
A. 0~1 分 B. 2~3 分  
C. 4~7 分 D. 8~10 分

9. 引起新生儿肺透明膜病的主要原因是  
A. 缺少肺表面活性物质 B. 叶酸缺乏  
C. 严重感染 D. 吸入羊水

10. 新生儿胆红素代谢特点是  
A. 肠壁吸收胆红素减少 B. 肝细胞受体蛋白丰富  
C. 肝酶系统发育不完善 D. 胆红素产生相对过少

11. 患儿女，8个月，体重6.5kg，生后母乳喂养，腹泻2个月余，未添加辅食。查体：面色苍白，腹部皮下脂肪厚度0.5cm，诊断为营养不良。实验室检查明显减少的是  
A. C反应蛋白 B. 肌酐  
C. 总胆固醇 D. 血清白蛋白

12. 维生素D缺乏性佝偻病患儿口服维生素D治疗量应持续服用  
A. 1个月 B. 2个月  
C. 3个月 D. 4个月

13. 氧疗的适应证是患儿出现发绀、动脉血氧分压低于  
A. 60mmHg B. 65mmHg  
C. 70mmHg D. 75mmHg

14. 支气管哮喘慢性持续期首选的治疗药物是  
A. 氨茶碱 B. 抗生素  
C. 肾上腺素 D. 糖皮质激素

15. 引起婴幼儿秋季腹泻常见的病毒是  
A. 柯萨奇病毒 B. 腺病毒  
C. 埃可病毒 D. 轮状病毒

16. 腹泻患儿在脱水性质未确定时，静脉补液可选用的液体张力是  
A. 1/2 张                                   B. 1/3 张  
C. 2/3 张                                   D. 1/3~1/5 张
17. 重度脱水的腹泻患儿，扩容阶段输液完成时间为  
A. 30~60min                               B. 1~2h  
C. 2~4h                                      D. 8~12h
18. 左向右分流型的先天性心脏病是  
A. 法洛四联症                             B. 房间隔缺损  
C. 主动脉缩窄                             D. 大动脉错位
19. 幼儿发生充血性心力衰竭时心率大于  
A. 120 次/分                               B. 140 次/分  
C. 160 次/分                               D. 180 次/分
20. 引起病毒性心肌炎最常见的病原菌是  
A. 巨细胞病毒                             B. EB 病毒  
C. 柯萨奇病毒                             D. 轮状病毒
21. 诊断中度贫血的血红蛋白指标是  
A. 130~110g/L                             B. 110~100g/L  
C. 90~60g/L                                D. 50~30g/L
22. 患儿男，8个月，高热6天，可见眼结膜充血，口唇干红皲裂，杨梅舌，左颈部淋巴结肿大，手足硬性水肿，皮肤有红色斑丘疹。血常规：白细胞增高，以中性粒细胞为主，首先考虑的是  
A. 猩红热                                    B. 风湿热  
C. 麻疹                                       D. 川崎病
23. 患儿男，7岁，眼睑浮肿、少尿、肉眼血尿4天，诊断为急性肾小球肾炎，该患儿可恢复正常生活的条件是  
A. 血沉正常                                B. 患病后3个月  
C. Addis 计数正常                       D. 肉眼血尿消失
24. 急性感染性多发性神经根神经炎主要症状是  
A. 呼吸障碍                                B. 运动障碍  
C. 颅神经障碍                             D. 感觉障碍

25. 患儿女，8岁，诊断为1型糖尿病，胰岛素注射的部位不包括  
A. 胸壁                           B. 腹壁  
C. 臀部                           D. 上臂外侧
26. 某学校发现一学生出现麻疹，该班其他学生应检疫的时间是  
A. 7天                           B. 14天  
C. 21天                           D. 28天
27. 患儿女，7岁，发热1天，左腮部以耳垂为中心逐渐肿大，肿胀腮腺的边缘不清伴有疼痛，正确的护理措施是  
A. 进食果汁增加食欲           B. 多进食饼干  
C. 用生理盐水漱口              D. 肿胀处热敷
28. 小儿癫痫最常见的发作类型是  
A. 简单部分运动性发作       B. 全身性强直-阵挛发作  
C. 复杂部分性发作              D. 失神发作
29. 采用洗肠法清除毒物，适用于毒物食入后  
A. 1小时                          B. 2小时  
C. 3小时                          D. 4小时
30. 小儿急救时静脉用肾上腺素 $0.1ml/kg$ ，所用肾上腺素的浓度是  
A. 1:10                           B. 1:100  
C. 1:1000                        D. 1:10000

### 非选择题部分

注意事项：

用黑色字迹的签字笔或钢笔将答案写在答题纸上，不能答在试题卷上。

**二、填空题：本大题共10空，每空1分，共10分。**

31. 遗尿症是指\_\_\_\_\_岁以后的儿童仍有经常性的不自主排尿。
32. 3个月的健康小儿应接种的疫苗是\_\_\_\_\_和\_\_\_\_\_。
33. 早产儿是指胎龄小于\_\_\_\_\_周的新生儿。
34. 濒死儿童父母的心理反应过程可分为五个阶段：否认震惊、\_\_\_\_\_、协议或磋商、抑郁、接受。

35. 法洛四联症患儿临床症状的严重程度与\_\_\_\_\_程度成正比。
36. 单纯性维生素 B<sub>12</sub> 缺乏引起营养性巨幼细胞贫血的患儿，不宜加用\_\_\_\_\_治疗，以免加重震颤、抽搐等神经精神症状。
37. 急性感染性多发性神经根神经炎脑脊液检查特征性表现是\_\_\_\_\_现象。
38. 癫痫持续状态是指癫痫发作持续\_\_\_\_\_分钟以上，或反复发作、发作间期意识不恢复者。
39. 过敏性紫癜患儿皮肤紫癜呈对称性分布，以\_\_\_\_\_部位最多见，其次是臀部和上肢远端。

**三、名词解释题：本大题共 5 小题，每小题 3 分，共 15 分。**

40. 青春期
41. 足月小样儿
42. 佝偻病颅骨软化
43. 高渗性脱水
44. 差异性发绀

**四、简答题：本大题共 5 小题，每小题 5 分，共 25 分。**

45. 简述小儿各系统器官发育的不平衡性。
46. 简述辅食添加的原则。
47. 简述新生儿窒息复苏后的观察和护理。
48. 简述蛋白质-能量营养不良患儿病情观察要点。
49. 简述水痘患儿皮疹的护理要点。

**五、论述题：本大题共 2 小题，每小题 10 分，共 20 分。**

50. 患儿男，6岁，因“眼睑浮肿4天，下肢浮肿5天”入院。查体：眼睑颜面水肿，阴囊中度水肿，下肢可凹性水肿，心肺腹无异常。实验室检查：尿蛋白（++++），血浆总蛋白及白蛋白明显减少。诊断为肾病综合征，给予肾上腺皮质激素治疗。

根据以上资料回答：

该患儿水肿的护理及预防感染的措施。

51. 患儿女，10个月，咳嗽3天。近1天来发热 $38^{\circ}\text{C} \sim 39^{\circ}\text{C}$ ，咳嗽加重，以“支气管肺炎”收入院。查体：T $38.8^{\circ}\text{C}$ ，R 50次/分，P 160次/分，可见鼻翼扇动及三凹征，口周发绀，两肺布满中小水泡音、喘鸣音及痰鸣音。

根据以上资料回答：

- (1) 该患儿的主要护理问题。
- (2) 该患儿的主要护理措施。